

VICHY НОРМАДЕРМ Засіб для комплексної терапії проблемної шкіри обличчя, 50 мл

Склад: AQUA / WATER - DIMETHICONE - GLYCERIN - HYDROGENATED POLYISOBUTENE - ALCOHOL DENAT. - BUTYLENE GLYCOL - GLYCERYL STEARATE - SALICYLIC ACID - AMMONIUM POLYACRYLDIMETHYLTAURAMIDE / AMMONIUM POLYACRYLOYLDIMETHYL TAURATE - ISOPROPYL LAUROYL SARCOSINATE - OCTYLDODECANOL - PEG-100 STEARATE - CI 42090 / BLUE 1 - STEARYL ALCOHOL - DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER - SILICA Silylate - SODIUM HYDROXIDE - SILICA - SODIUM POLYACRYLATE - PERLITE - PHENYLETHYL RESORCINOL - POLOXAMER 338 - DISODIUM EDTA - CAPRYLOYL SALICYLIC ACID - CAPRYLOYL GLYCINE - XANTHAN GUM - ACRYLONITRILE/METHYL METHACRYLATE/VINYLLIDENE CHLORIDE COPOLYMER - PARFUM / FRAGRANCE

Форма випуску: флакон з дозатором, 50 мл

Виробник: Лабораторія VICHY

Торгова марка: VICHY

Показання до застосування: Комплексна корекція проблемної шкіри в будь-якому віці.

Бореться із:

Запальними елементами

Слідами від акне

Розширеними порами

Жирним блиском

Тьмяним кольором обличчя

Удосконалена формула з вмістом [Air Licium + Phe resorcinol (Еір Ліціум + Фе резорцінол)] робить пори менш помітними та контролює жирний блиск шкіри. Саліцилова кислота в складі засобу сприяє зниженню проявів акне. З кожним днем недоліки стають все менш помітними, шкіра випромінює красу та сяння.

ЕФЕКТИВНІСТЬ:

-75% Запальні та елементи **

-25% Вироблення шкірного себуму **

-14% Розширені пори **

-28% Ознаки дисхромії **

** Клінічне тестування, 8 тижнів, 50 жінок.

Індивідуальні результати можуть відрізнятися.

Спосіб застосування:

Наносити щоденно на проблемні ділянки очищеної шкіри обличчя. Уникати ділянки навколо очей.

Особливості застосування:

Протестовано під дерматологічним контролем. Некомедогенно. Без парабенів.

Термін придатності: не більше 36 місяців з дати виготовлення при температурі від 0 °С до 25 °С і відносній вологості повітря не більше 75 %

Умови зберігання: зберігати уникаючи прямої дії сонячних променів. Використати протягом 6 місяців від початку користування. Не використовувати після закінчення терміну придатності